

PULMICOSIN 30-35

TILMICOSINA 30 % + GUAIFENESINA 3% + BROMHEXINA 0.5%

ANTIMICOPLASMICO DE USO ORAL

Reg ICA No. 8860 - MV



- **COMPOSICIÓN** Cada 100 mL de PULMYCOSIN 30-35 contienen:
- | | |
|-------------------|---------|
| Tilmicosina | 30.0 g. |
| Guaifenesina | 3.0 g. |
| Bromhexina | 0.5 g. |
| Excipientes c.s.p | 100 mL. |

► **INDICACIONES**

PULMYCOSIN 30-35 Esta indicado para el control y tratamiento de Enfermedad Respiratoria Crónica (ERC) de las **AVES:** (Pollos de Engorde, Pollonas de Reemplazo y Reproductoras) causadas por bacterias sensibles a la Tilmicosina tales como: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae* (aerosaculitis, sinovitis), *Mycoplasma meleagridis*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Ornithobacterium rhinotracheale*.

En **CERDOS:** PULMYCOSIN 30-35 esta indicado para el tratamiento de Neumonías causadas por: *Mycoplasma spp.*, *Pasteurella spp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Treponema hyodysenteriae* (Disentería Porcina).

► **RECOMENDACIONES**

- Ⓜ No administrar a Aves cuyos huevos se destinen al consumo humano.
- Ⓜ No permita que Equinos beban agua medicada con PULMYCOSIN 30-35
- Ⓜ Durante el tratamiento suministre agua medicada con PULMYCOSIN 30-35 como única fuente de bebida.

► **PRESENTACIONES**

Dispensador de 15 Goteros x 10 mL
frascos x- 500 mL - 1 litro

► **DOSIS Y ADMINISTRACIÓN**

EN AVES: La TILMICOSINA se administra en el agua de bebida a razón de 15 a 20 miligramos por Kilogramo de peso vivo/día, durante un periodo de 3 a 5 días seguidos.

EN CERDOS: Use 20 miligramos por Kilogramo de peso vivo/día, durante 5 a 7 días continuos.

EN FORMA PRÁCTICA: Para Aves y Cerdos use 1mL de PULMYCOSIN 30-35 por cada 3.5 Lts de agua de bebida, durante 3 a 5 días consecutivos o según criterio del Médico Veterinario/Asistente Técnico.

► **TIEMPO DE RETIRO**

Los animales tratados con PULMYCOSIN 30-35 no deben sacrificarse para consumo humano hasta siete (7) días después de finalizado el tratamiento.

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 15° - 35° C.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS
PROTEJASE DEL CALOR Y LA HUMEDAD
PRODUCTO NO TOXICO
VENTA BAJO FORMULA DEL MEDICO VETERINARIO

