

RESPIROX - BF

BROMHEXINA 0.35% + GUAIFENESINA 2%+ EUCALIPTOL 10%

BRONCOSECRETOLITICO Y ESPECTORANTE DE USO ORAL

Reg ICA No.5453 - DB
 REGISTRO MAG No. CO69-52-9-5041
 Reg ECUADOR No. 6B-6E-12429-AGROCALIDAD
 Reg. PANAMA No. RF - 3687-17



COMPOSICIÓN

BROMHEXINA CLORIDRATO	0.35 g.
GUAIFENESINA (Guayacolato de glicerio)	2.00 g.
MENTOL	0.30 g.
EXCIPIENTES (EUCALIPTOL,NH40H, Etanol, Nonil,Twen, CMC, Preservantes) C.S.P	100 mL

Agentes Coadyuvantes:

Etanol, Alcanfor,Salicilato de Metilo.

INDICACIONES

RESPIROX - BF Mucolítico, Expectorante, Broncodilatador y Antitusivo, Coadyuvante de la terapia antimicrobiana en todas las enfermedades respiratorias, severas, agudas o crónicas que cursen con secreción de moco y aumento de su viscosidad, bien sean de naturaleza infecciosa o no. **AVES:** Coadyuvante en casos de Coriza Infecciosa, Pasteurellosis, Enfermedad Respiratoria Crónica y reacciones post - vacunales virales como en New Castle, Bronquitis Infecciosa, Influenza y Mycoplasmosis, entre otras. **CERDOS:** Coadyuvante en casos de Neumonía en general, Pleuroneumonía porcina, Neumonía enzootica porcina, Rinitis alérgica, Rinitis secas, Sinusitis, Tos mecánica por polvo del alimento y Catarros, entre otras. **RESPIROX - BF** Se debe administrar asociado con antibióticos, siempre que la naturaleza de la enfermedad respiratoria sea de origen infeccioso o según el criterio del Médico Veterinario o Zootecnista. De esta forma la recuperación de los animales es mucho mas rápida y segura.

RECOMENDACIONES

Mantener **RESPIROX -BF** en lugar fresco y **fuera del alcance de los niños.**

PRESENTACIONES

Garrafa por 1 Litro, 4 Litros y 20 Litros.
Dispensador de 12 frascos por 120 mL.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

RESPIROX - BF se administra vía oral en el agua de bebida o en Aspersiones y/o Nebulizaciones por un periodo de 3 - 5 días de tratamiento o durante el tiempo que dure la terapia antibiótica.

DOSIS AGUA DE BEBIDA		DOSIS: ASPERSIONES Y/O NEBULIZACIONES	
Aves: 0,5 mL-1,0 mL de RESPIROX - BF por litro de agua de bebida.		Aves: utilice 100-300 mL de RESPIROX - BF para 20 litros de agua. Realice una aspersion diaria durante 3 - 5 días o durante el tiempo que dure la terapia antibiótica.	
Bovinos y Equinos Adultos: 40-50 mL animal/día por 3 a 5 días.		Modo de Acción: RESPIROX-BF es el único agente Broncosecretolítico que reúne en una misma formulación seis (6) ingredientes activos, que al interactuar entre sí, generan una multiacción conocida por su efecto de "Sinergismo Positivo", es así que simultáneamente se sucede una triple estimulación, con efectos mucolíticos, broncodilatadores, expectorantes y antitusivos.	
Becerras y Potros: 12-25 mL animal/día por 3 a 5 días.			
Cerdos Adultos: 15-20 mL animal día por 3 a 5 días.			
Lechones: 5 mL - 10 mL animal/día por 3 a 5 días.			
Gatos: 0.5-1,0 mL por animal/día de 3 a 5 días.			
Perros: 2-8 mL por animal/día de 3 a 5 días.			

En forma practica utilice la siguiente tabla para Avicultura:

TABLA PARA CALCULAR LAS CANTIDADES DE RESPIROX - BF EN EL AGUA DE BEBIDA DE AVES			
Edad en semanas	Peso x ave (gramos)	Consumo de agua en litros x 1000 aves (18°C - 22°C)	RESPIROX - BF ml x 1000 aves
0	60 - 65	30	15 -30
1	140 - 160	50	25 -50
2	400 - 450	100	50 - 100
3	700 - 750	150	75 -150
4	1000 - 1050	200	100 - 200
5	1500 - 1600	280	140 - 280

