

APSASOL POLICICLINA T

Polvo hidrosoluble oral

COMPOSICIÓN:

Tilosina (tartrato)	250 g
Sulfametacina (sódica)	110 g
Tetraciclina (clorhidrato)	110 g
Ácido nicotínico	15 g
Vitamina A	10 MIU
Vitamina C	25 g
Vitamina K3	10 g
Excipiente c.s.p	1000 g

INDICACIONES:

APSASOL POLICICLINA T actúa contra gérmenes Gram+ y Gram-, especialmente contra E.coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., en procesos específicos o en complicaciones de enfermedades víricas. Su espectro de acción comprende bacterias Gram-, Actinomycetes, Mycoplasmae, Spirochaeta, Chlamydia, Rickettsia y ciertas micobacterias.

Aves: prevención y tratamiento de CRD, enteritis y salmonelosis.

Cerdos: prevención y tratamiento de las enfermedades respiratorias, enteritis, artritis e infecciones del aparato reproductor.

Bovino, ovino, caprino: prevención y tratamiento de las enfermedades respiratorias, enteritis.

Conejos: estrés, pasteurelisis, colibacilosis.

DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO:

Porcino: **Dosis Preventiva:** 40 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día (0.5 g de Apsasol Policiclina T/L de agua de bebida) durante 7 días. **Dosis Curativa:** 80-160 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día (1-2 g de Apsasol Policiclina T/L agua de bebida) durante 5 días.

Aves: **Dosis Preventiva:** 125 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día (0.5 g de Apsasol Policiclina T/L de agua de bebida) durante 7 días. **Dosis Curativa:** 250 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día (1-2 g de Apsasol Policiclina T/L agua de bebida) durante 5 días.

Bovino: **Dosis Preventiva:** 50 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día (0.5 g de Apsasol Policiclina T/L de agua de bebida) durante 7 días. **Dosis Curativa:** 100-200 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día (1-2 g de Apsasol Policiclina T/L agua de bebida) durante 5 días.

Ovino, Caprino y Conejos: **Dosis Preventiva:** 50 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día (0.5 g de Apsasol Policiclina T/L de agua de bebida) durante 7 días. **Dosis Curativa:** 100 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día (1-2 g de Apsasol Policiclina T/L agua de bebida) durante 5 días.

INSTRUCCIONES DE USO:

Administración por vía oral en el agua de bebida.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar a rumiantes adultos (rumen funcional), a animales con insuficiencia renal grave o insuficiencia hepática, con discrasia sanguínea, a animales sensibles a las sulfonamidas o tetraciclinas.

No administrar a animales con hipersensibilidad a la tilosina. Usar con precaución en animales que sufren insuficiencia renal o insuficiencia hepática. No utilizar en caballos.

PERIODO DE RETIRO: Carne: 28 días.

Advertencias:

Gallinas ponedoras: No administrar APSASOL POLICICLINA T durante la puesta, en caso de huevos destinados al consumo humano. Leche: No administrar APSASOL POLICICLINA T durante la gestación o la lactancia.

CONSERVACIÓN: Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. Temperatura de almacenamiento: 15-30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

VENTA BAJO RECETA VETERINARIA

